

# A FLÓRULA FANEROGÂMICA DO ESTADO DO PARÁ. ILHAS DE MAIANDEUA E ALGODOAL - I

## FAMÍLIA CONVULVULACEAE JUSS

Carlos Fernando R. Wanderley (Bolsista de Iniciação Científica)  
e João Ubiratan Moreira dos Santos (Pesquisador do DBO/MPEG/CNPq)

Nas restingas das ilhas de Algodual e Maiandeu a família Convolvulaceae Juss. está representada pelo gênero *Ipomoea* L. através das espécies *I. asarifolia* (Desr.) Roemer & Schultes, *I. goyazensis* Gardner, *I. pes-caprae* (L.) R. Brow e *I. stolonifera* (Cyrili) Gmelin. Para execução deste trabalho utilizou-se material coletado nas ilhas de Maiandeu e Algodual e exemplares do herbário do MPEG. As observações morfológicas foram realizadas em estereomicroscópio ZEISS acoplado a câmara clara. A nomenclatura adotada para indicar a forma e indumento das estruturas morfológicas, foi baseada nos trabalhos de LAWRENCE (1973) e RIZINNI (1977). *I. asarifolia* é uma erva reptante, com caule latescente, folhas cordiformes, corola lilás a púrpura. *I. goyazensis* é um cipó que cresce sobre arbustos, apresentando folhas cordiformes a ligeiramente ovais, corola vermelho carmim. *I. pes-caprae* é uma erva de caule latescente com folhas obcordiformes a ovais, ápice emarginado, raro aculeado, ligeiramente carnosas, corola lilás a púrpura. *I. stolonifera* é uma erva reptante com folhas lineares, lanceoladas ou raramente oblongas, ápice levemente emarginado, corola branca. Algumas características de anatomia de folha estão sendo estudadas com o objetivo de ajudar na separação das espécies (CNPq/Museu Goeldi).