

A flórua fanerogâmica das restingas do estado do Pará. Família Sapotaceae Jussieu

Danielle da Silva Corrêa

Orientador: Dr. João Ubiratan M. dos Santos

Vigência da bolsa: agosto/01 a julho/02

A região litorânea do Brasil apresenta grande diversidade de comunidades vegetais. Do ponto de vista florísticos, as restingas do sudeste e sul brasileiro são as mais bem estudadas, ao contrário do litoral do estado do Pará, que possui uma extensa área coberta por restingas de grande beleza e valor econômico, porém pouco conhecida sob o ponto de vista botânico, e encontra-se ameaçada pela ação antrópica. O presente trabalho teve como objetivo realizar estudos taxonômicos das espécies da família Sapotaceae Juss., ocorrentes nas restingas da costa paraense, nordeste do Estado. Para este estudo foi feito um levantamento das mesmas ao longo do litoral paraense, os espécimes foram coletados, identificados por comparação com outros espécimes nos herbários MG e IAN e através da literatura existente e depositados nos herbário MG. Nesta área estão distribuídas diversas famílias de plantas, entre elas, a Sapotaceae Juss., que está representada no Brasil por 12 gêneros e 103 espécies, sendo que nas restingas do Pará ocorrem os gêneros *Pouteria* Aublet., *Micropholis* (Grisebach) Pierre e *Manilkara* (F. Alle.) Monachino. Estes estão representados pelas seguintes espécies: *Pouteria ramiflora* (Mart.) Radlk. Árvore de aproximadamente 4 m de altura; folhas ca. de 38-48 mm larg. e 70-95 mm compr., alternas arranjadas em espiral, coriácea, oblonga-lanceoladas, ápice acuminado, base obtusa, margem inteira; inflorescência axilar, em fascículo. *Micropholis venulosa* (Mart. & Eichl.) Pierre. Arbusto ca. 3 m de altura; folhas ca. de 30-82 mm compr. e 20-38 mm larg., alternas, oblonga-lanceoladas, ápice acuminado, base obtusa, margem repanda; inflorescência axilar, em fascículo; botões florais ferruginosos. *Manilkara triflora* (F. Alle.) Monachino. Árvore de 4m de altura; folhas ca. de 21-63 mm compr. e 12-26 mm larg., alternas, espiraladas, obovada-oblongas, ápice retuso, base cuneada, margem revoluta; flores em fascículos; fruto imaturo. *Manilkara bidentata* subsp. *surinamensis* (Miq.) T.D. Penn. Árvore ca. de 3 m de altura; folhas ca. de 70-210 mm compr., alternas, oblongas, ápice arredondado, base cuneada, margem inteira .